




RECOMMANDATIONS POUR LA REALISATION DU PRELEVEMENT VAGINAL PAR AUTO-PRELEVEMENT

Laboratoire de biologie
Tél (secrétariat) : 02.72.27.85.10

- 1) Lavez-vous les mains avant de réaliser l'auto-prélèvement.
- 2) Ouvrez le sachet contenant le tube avec milieu de transport et l'écouvillon et posez le tube sur une surface plane.
- 3) Ouvrez partiellement le sachet contenant l'écouvillon (Figure 1). Récupérez l'écouvillon en prenant garde de ne pas toucher le coton ou de ne pas le laisser tomber, sinon **demandez un nouveau kit de prélèvement.**
- 4) Prenez l'écouvillon dans votre main entre le pouce et l'index, au milieu de la tige (Figure 2).
- 5) Introduisez délicatement l'écouvillon dans le vagin sur environ 5 cm. Tournez lentement l'écouvillon pendant 10 à 30 secondes (Figure 3). Assurez-vous que l'écouvillon touche bien les parois vaginales. Retirez l'écouvillon sans toucher la peau.
- 6) Toujours en tenant l'écouvillon dans votre main, dévissez délicatement le bouchon du tube sans renverser son contenu et placez immédiatement l'écouvillon à l'intérieur du tube. Si vous renversez le contenu du tube, **demandez un nouveau kit de prélèvement.**
- 7) Cassez délicatement l'écouvillon au niveau de l'encoche (Figure 4).
- 8) Refermez le tube en vissant fermement.






LAB-FI-033 ■ Version 1 ■ 14/03/23

RECOMMANDATIONS POUR LA REALISATION DU PRELEVEMENT VAGINAL PAR AUTO-PRELEVEMENT

Laboratoire de biologie
Tél (secrétariat) : 02.72.27.85.10

- 1) Lavez-vous les mains avant de réaliser l'auto-prélèvement.
- 2) Ouvrez le sachet contenant le tube avec milieu de transport et l'écouvillon et posez le tube sur une surface plane.
- 3) Ouvrez partiellement le sachet contenant l'écouvillon (Figure 1). Récupérez l'écouvillon en prenant garde de ne pas toucher le coton ou de ne pas le laisser tomber, sinon **demandez un nouveau kit de prélèvement.**
- 4) Prenez l'écouvillon dans votre main entre le pouce et l'index, au milieu de la tige (Figure 2).
- 5) Introduisez délicatement l'écouvillon dans le vagin sur environ 5 cm. Tournez lentement l'écouvillon pendant 10 à 30 secondes (Figure 3). Assurez-vous que l'écouvillon touche bien les parois vaginales. Retirez l'écouvillon sans toucher la peau.
- 6) Toujours en tenant l'écouvillon dans votre main, dévissez délicatement le bouchon du tube sans renverser son contenu et placez immédiatement l'écouvillon à l'intérieur du tube. Si vous renversez le contenu du tube, **demandez un nouveau kit de prélèvement.**
- 7) Cassez délicatement l'écouvillon au niveau de l'encoche (Figure 4).
- 8) Refermez le tube en vissant fermement.



LAB-FI-033 ■ Version 1 ■ 14/03/23